



**Státní
veterinární
správa**

**Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Středočeský kraj**

Černošská 1929, Benešov, 256 01
T: +420 317 742 033
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv



svspes97fe7620

Č. j.: SVS/2025/023962
Vyřizuje: MVDr. Jakub Škrabal
Telefon: +420 317 742 033

Viz. rozdělovník

V Benešově dne 11.02.2025

Informace o potvrzení ohniska ptačí chřipky v k.ú. Míšovice, Hlavní město Praha, okolním obcím

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

Dovolte mi, abych Vás tímto dopisem informoval o výskytu nebezpečné nákazy ptáků vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) v malochovu drůbeže v k.ú. Míšovice na území Hlavního města Prahy. Ohnisko se nachází u hranic Hlavního města Prahy s krajem Středočeským a území Vaší obce se nachází v blízkém okolí (do 10 km) tohoto ohniska.

Vzhledem k tomuto si Vás dovoluujeme požádat o předání informace o zvýšeném riziku ptačí chřipky v oblasti a o doporučeních Státní veterinární správy obyvatelům Vaší obce.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj nebude v souvislosti s uvedeným ohniskem vysoce patogenní aviární influenzy v chovu ptáků chovaných v zajetí v souladu s platnými právními předpisy vyhlášovat mimořádná veterinární opatření kolem tohoto ohniska, tzv. uzavřená pásma (ochranné pásmo o poloměru 3 km a pásmo dozoru o poloměru 10 km).

V současnosti tedy nejsou ve Vaší oblasti nařízena žádná omezující opatření týkající se ptačí chřipky, v případě, že by se nákazová situace zhoršila, budete neprodleně informováni.

Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí se doporučuje důsledně dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech spočívající zejména v ochraně chovaných ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou nejčastějším zdrojem nákazy pro chované ptáky. V následujících 30 dnech se doporučuje vypouštět chované ptáky pouze do ohraničených venkovních prostorů/výběhů a zabránit přístupu na volné vodní plochy, na kterých by se mohli vyskytovat vodní volně žijící ptáci. Krmivo a napájecí vodu určenou pro

chované ptáky se doporučuje umístit do budov, popř. pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva.

V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili na krizovou linku KVS SVS pro Středočeský kraj tel.: +420 720 995 204

V případě nálezu zvýšených úhynů u volně žijících ptáků ve Vaší obci nebo v její blízkosti rovněž, prosím, informujte KVS SVS pro Středočeský kraj na výše uvedenou krizovou linku a jednejte dle pokynů.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

MVDr. Otto Vraný
ředitel
podepsáno elektronicky

Příloha:

Informační leták k ptačí chřipce pro drobnochovatele

Ptačí chřipka – informace pro drobnochovatele



Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka, je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů. K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři.

Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a vzplanutím klinických příznaků. V případě influenzy je to pouze několik dní. První příznaky se obvykle objeví do jednoho týdne.

Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat, mají dýchací potíže, jsou apatická (obr. 1). Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví úplné nechutenství. Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání). Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu. Zjišťovány jsou krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčkách (obr. 2), edém hlavy (obr. 3). Mohou se objevit otoky a krváceniny na končetinách (obr. 4).



obr. 1



obr. 2



obr. 3



obr. 4

V případě podezření na výše uvedené příznaky u ptáků informujte ihned o události soukromého veterinárního lékaře nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu. Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého místa

Zásady pro drobnochovatele drůbeže

V rizikových obdobích (jarní a podzimní migrace volně žijících ptáků) výrazně doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů, tam kde je to technicky a provozně možné, umístění zvířat uvnitř budov.

- ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem;
- slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží;
- v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky;
- krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem;
- **pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci, nebo v blízkosti těchto vodních ploch a toků;**
- pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží; ke kterým mají přístup volně žijící ptáci
- venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany);
- zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků.



**Státní
veterinární
správa**